

# 2019年度 水稲用農薬使用基準

種 別	特裁可否	農薬名	使用量	摘 要	使用時期	使用回数 (以内)	
殺菌・殺虫剤		モミガードC水和剤	靱と薬液の容量比1:1以上	200倍希釈、24時間浸漬	浸種前	1	
	特裁可	ダコニール1000	10/箱	苗立枯病、1000～2000倍希釈	播種時～緑化期（播種14日後まで）	2	
	特裁可	ルーチンエキスパート箱粒剤	50g/箱	いもち病、紋枯病、本田主要害虫	播種時～移植当日	1	
		オリゼート粒剤	3～4kg/10a	いもち病	葉いもちには初発7日～10日前（6月上旬頃） 穂いもちには出穂3～4週間前 収穫14日前まで	2	
		ビームダントツH粉剤DL	3～4kg/10a	いもち病、カメムシ類、ウンカ類、イナゴ類	収穫7日前まで	2	
		ラブバリダトレボン粉剤DL	3～4kg/10a	いもち病、紋枯病、カメムシ類	収穫14日前まで	3	
		リンパー粒剤	3～4kg/10a	紋枯病	収穫30日前まで	2	
		バリダシン粉剤DL	3～4kg/10a	紋枯病	収穫14日前まで	5	
	特裁可	MR、ジョーカー粉剤DL	3～4kg/10a	カメムシ類、イナゴ類、ウンカ類、ニカメイチュウ、ヨコバイ	収穫7日前まで	2	
	特裁可	アルバリン粉剤DL	3kg/10a	カメムシ類、イナゴ類、ウンカ類、ヨコバイ	収穫7日前まで	3	
	特裁可	アルバリン粒剤	3kg/10a	カメムシ類、ニカメイチュウ、ウンカ類、ヨコバイ	収穫7日前まで	3	
		エルサンパッサ粉剤20DL	3～4kg/10a	カメムシ類、ヨコバイ、ニカメイチュウ、イナゴ、ウンカ類	収穫7日前まで	2	
倒伏軽減剤		スマレクト粒剤	2～3kg/10a	湛水状態で散布し、7日間は落水やかけ流しをしない	出穂7～20日前	1	
移植栽培	（初期除草剤）		ソルネット1キロ粒剤	1kg/10a	雑草発生前～発生初期	移植時 移植直後～ノビエ1.0葉期まで（移植後30日まで）	1
			マーシェットジャンボ	500g/10a	雑草発生前～発生初期	移植後1日～ノビエ1.0葉期まで（移植後30日まで）	1
			シング乳剤	300mℓ/10a	雑草発生前～発生初期	移植直後～ノビエ1.0葉期まで（移植後30日まで）	1
	（初中期除草剤）	直播可	オサキニ1*粒剤	1kg/10a	初中期一発	移植直後～ノビエ3.0葉期まで（移植後30日まで）	1
		直播可	銀河1*粒剤	1kg/10a	初中期一発	移植時 移植直後～ノビエ3.0葉期まで（収穫60日前まで）	1
		省農薬可	ゴエモン1*粒剤	1kg/10a	初中期一発	移植時 移植直後～ノビエ2.5葉期まで（移植後30日まで）	1
		特裁可	カウシルコンプリート1*粒剤	1kg/10a	初中期一発	移植時 移植直後～ノビエ3.5葉期まで（移植後30日まで）	1
		省農薬可	ゴエモンジャンボ	300g/10a	初中期一発	移植直後～ノビエ2.5葉期まで（移植後30日まで）	1
		特裁可	カウシルコンプリートジャンボ	300g/10a	初中期一発	移植後5日～ノビエ3.0葉期まで（移植後30日まで）	1
			銀河フロアブル	500mℓ/10a	初中期一発	移植後5日～ノビエ3.0葉期まで（移植後30日まで）	1
		特裁可	カウシルコンプリートフロアブル	500mℓ/10a	初中期一発	移植後5日～ノビエ3.5葉期まで（移植後30日まで）	1
	ヒエ専用	特裁可	クリンチャー1キロ粒剤	1kg/10a 1.5kg/10a	後発ヒエ	移植後7日～ノビエ4.0葉期まで（収穫30日前まで） 移植後25日～ノビエ5.0葉期まで（収穫30日前まで）	2 2
	ヒエ+多年生		ワイドアタックD1*粒剤	1kg/10a	後発ヒエ+広葉雑草	移植後15日～ノビエ5.0葉期まで（収穫60日前まで）	1
			ニトワリュウ1*粒剤	1kg/10a	後発ヒエ+広葉雑草	移植後15日～ノビエ4.0葉期まで（収穫60日前まで）	1
		ニトワリュウジャンボ	500g/10a	後発ヒエ+広葉雑草	移植後15日～ノビエ4.0葉期まで（収穫60日前まで）	1	
直播栽培	（初中期除草剤）		オサキニ1*粒剤	1kg/10a	初中期一発	播種時 播種直後～ノビエ3.0葉期まで（収穫90日前まで）	1
			銀河1*粒剤	1kg/10a	初中期一発	イネ2.0葉期～ノビエ3.0葉期まで（収穫60日前まで）	1
			ゴエモン1*粒剤	1kg/10a	初中期一発	イネ1.0葉期～ノビエ2.5葉期まで（収穫90日前まで）	1
		特裁可	カウシルコンプリート1*粒剤	1kg/10a	初中期一発	播種時 播種直後～ノビエ3.5葉期まで（収穫90日前まで）	1
		省農薬可	ゴエモンジャンボ	300g/10a	初中期一発	イネ1.0葉期～ノビエ2.5葉期まで（収穫90日前まで）	1
		特裁可	カウシルコンプリートジャンボ	300g/10a	初中期一発	イネ1.0葉期～ノビエ3.0葉期まで（収穫90日前まで）	1
	ヒエ専用	特裁可	クリンチャー1*粒剤	1kg/10a 1.5kg/10a	後発ヒエ	播種後10日～ノビエ3.0葉期（収穫30日前まで） 播種後25日～ノビエ4.0葉期まで（収穫30日前まで）	2 2
	ヒエ+多年生		ワイドアタックD1*粒剤	1kg/10a	後発ヒエ+広葉雑草	イネ3.0葉期～ノビエ5.0葉期まで（収穫60日前まで）	1
			ニトワリュウ1*粒剤	1kg/10a	後発ヒエ+広葉雑草	イネ4.0葉期～ノビエ4.0葉期まで（収穫60日前まで）	1
			ニトワリュウジャンボ	500g/10a	後発ヒエ+広葉雑草	イネ4.0葉期～ノビエ4.0葉期まで（収穫60日前まで）	1
		特裁可	ラウンドアップマックスロード	200～1000mℓ/10a	通常散布では50～1000/10a 少量散布では5～250/10a	収穫前日まで ※特裁で使用する場合は1回まで	2
（水田畦畔）		草枯らしMIC	250～1000mℓ/10a	通常散布では1000/10a 少量散布では25～500/10a	収穫14日前まで	2	
		ザクサ液剤	500～1,000mℓ/10a	100～1500/10aにうすめて加圧散布	収穫7日前まで	2	
		バスタ液剤	500～1,000mℓ/10a	100～1500/10aにうすめて加圧散布	収穫7日前まで	2	
		カソロン粒剤6.7	4～6kg/10a	全面土壌散布	水田畦畔 秋冬期～春期の雑草発生前～発生始期	1	