

2022年度 水稲用農薬【除草剤】使用基準

種 別	使用可否	農薬名	使用量	摘 要	使用時期	使用回数 (以内)	
移植栽培	(初期 除草剤)	ソルネット1キロ粒剤	1 k g / 10 a	雑草発生前～発生初期	移植時 移植直後～ノビエ1.0葉期まで (移植後30日まで)	1	
		シング乳剤	300mℓ/10 a	雑草発生前～発生初期	移植直後～ノビエ1.0葉期まで (移植後30日まで)	1	
	(中 期 一 発 除 草 剤)	直播可	マスラオ1* ₀ 粒剤	1 k g / 10 a	初中期一発	移植直後～ノビエ3.0葉期まで (移植後30日まで)	1
		直播可	銀河1* ₀ 粒剤	1 k g / 10 a	初中期一発	移植時 移植直後～ノビエ3.0葉期まで (収穫60日前まで)	1
		省農業可	ゼータタイガー1* ₀ 粒剤	1 k g / 10 a	初中期一発	移植時 移植直後～ノビエ3.0葉期まで (移植後30日まで)	1
		特裁可	カウンシルコンプリート1* ₀ 粒剤	1 k g / 10 a	初中期一発	移植時 移植直後～ノビエ3.5葉期まで (移植後30日まで)	1
		省農業可	ゼータタイガージャンボ	300g/10 a	初中期一発	移植直後～ノビエ3.0葉期まで (移植後30日まで)	1
		特裁可	カウンシルコンプリートジャンボ	300g/10a	初中期一発	移植後5日～ノビエ3.0葉期まで (移植後30日まで)	1
		省農業可	ゼータタイガーフロアブル	500mℓ/10 a	初中期一発	移植後5日～ノビエ3.0葉期まで (移植後30日まで)	1
	特裁可	カウンシルコンプリートフロアブル	500mℓ/10 a	初中期一発	移植後5日～ノビエ3.5葉期まで (移植後30日まで)	1	
	ヒエ専用	特裁可	クリンチャー1キロ粒剤	1 k g / 10 a	後発ヒエ	移植後7日～ノビエ4.0葉期まで (収穫30日前まで)	2
1.5 k g / 10 a				後発ヒエ	移植後25日～ノビエ5.0葉期まで (収穫30日前まで)	2	
ヒエ+多年生	直播可	ゲパード1* ₀ 粒剤	1 k g / 10 a	ヒエ+多年生広葉雑草	移植後14日～ノビエ4.0葉期まで (収穫60日前まで)	1	
直播栽培	除 草 剤	マスラオ1* ₀ 粒剤	1 k g / 10 a	初中期一発	播種時 播種直後～ノビエ3.0葉期まで (収穫90日前まで)	1	
		銀河1* ₀ 粒剤	1 k g / 10 a	初中期一発	イネ2.0葉期～ノビエ3.0葉期まで (収穫60日前まで)	1	
		省農業可	ゼータタイガー1* ₀ 粒剤	1 k g / 10 a	初中期一発	イネ1.0葉期～ノビエ3.0葉期まで (収穫90日前まで)	1
		特裁可	カウンシルコンプリート1* ₀ 粒剤	1 k g / 10 a	初中期一発	播種時 播種直後～ノビエ3.5葉期まで (収穫90日前まで)	1
		省農業可	ゼータタイガージャンボ	300 g / 10a	初中期一発	イネ1.0葉期～ノビエ3.0葉期まで (収穫90日前まで)	1
		特裁可	カウンシルコンプリートジャンボ	300 g / 10a	初中期一発	イネ1.0葉期～ノビエ3.0葉期まで (収穫90日前まで)	1
		省農業可	ゼータタイガーフロアブル	500mℓ/10 a	初中期一発	イネ1.0葉期～ノビエ3.0葉期まで (収穫90日前まで)	1
		特裁可	カウンシルコンプリートフロアブル	500mℓ/10 a	初中期一発	播種直後～ノビエ3.5葉期まで (収穫90日前まで)	1
	ヒエ専用	特裁可	クリンチャー1* ₀ 粒剤	1 k g / 10 a	後発ヒエ	播種後10日～ノビエ3.0葉期 (収穫30日前まで)	2
				1.5 k g / 10 a	後発ヒエ	播種後25日～ノビエ4.0葉期まで (収穫30日前まで)	2
	ヒエ+多年生		ゲパード1* ₀ 粒剤	1 k g / 10 a	ヒエ+多年生広葉雑草	イネ2.0葉期～ノビエ4.0葉期まで (収穫60日前まで)	1